

ЗИНЕРИТ®: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА

ЗИНЕРИТ® - эритромицин-цинковый комплекс. Оказывает противовоспалительное, противомикробное и комедонолитическое действие.

Показания к применению

Лечение угревой сыпи.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к эритромицину и другим макролидам; повышенная чувствительность к цинку.

Способ применения и дозы

Наружно. С помощью прилагаемого аппликатора Зинерит наносят с легким нажимом тонким слоем на пораженный участок кожи 2 раза в сутки: утром (до нанесения макияжа) и вечером (после умывания). Скорость нанесения раствора регулируется силой нажима аппликатора на кожу. Примерная разовая доза - 0,5 мл. После высыхания раствор становится невидимым. Продолжительность курса - 10-12 недель. В отдельных случаях возможно клиническое улучшение уже через 2 недели.

Побочное действие

Местные реакции: иногда может возникать ощущение жжения, раздражение, сухость

кожных покровов в месте нанесения препарата (как правило, эти явления слабо выражены и не требуют отмены препарата и/или проведения симптоматической терапии).

Особые указания

Необходимо избегать попадания в глаза, на слизистую оболочку полости рта и носа (возможно раздражение или ожог).

Беременность и лактация

В настоящее время установлено, что возможно применение препарата в периоды беременности и лактации (грудного вскармливания) по показаниям в рекомендуемых дозах.

Форма выпуска


Порошок для приготовления раствора для наружного применения в комплекте с растворителем и аппликатором. Упаковка препарата представляет собой два флакона, один из которых содержит активные вещества в виде порошка, другой - раствор вспомогательных компонентов.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Регистрационный номер: П № 013569/01-2002

Инструкция по приготовлению лекарственного средства



1. Упаковка содержит два флакона (А, В) и контейнер с аппликатором (С).
2. Налейте содержимое флакона А во флакон В, завинтите крышку и тщательно взболтайте.
3. Извлеките аппликатор из упаковки.
4. Протолкните аппликатор в горлышко флакона В и закрутите крышку. Флакон А можно выбросить. Готовый раствор может храниться в течение 5 недель после приготовления при температуре 15-25°С